



## Informe interpretativo

John S. March

# MASC<sup>2</sup>

Escala de Ansiedad Multidimensional para Niños/as.

## Cuestionario autoinforme

NOMBRE

SEXO

**Hombre**

EDAD

**10**

COLEGIO

CURSO

PROVINCIA DE RESIDENCIA

CÓDIGO CUESTIONARIO

**016206**

CÓDIGO CLIENTE

**José Tester**



## Introducción

La Escala multidimensional de ansiedad para niños, 2ª edición (MASC 2) es una prueba que mide diferentes aspectos de la ansiedad en niños y adolescentes de 8 a 19 años. A través de sus diferentes escalas y subescalas explora posibles síntomas físicos y psicológicos asociados a distintos trastornos de ansiedad. Cubre un rango amplio de síntomas de diferente severidad y puede ser un complemento útil en el proceso de diagnóstico.

Este informe interpretativo corresponde a las respuestas dadas en el autoinforme y en él se resumen los resultados que ha obtenido la persona que ha respondido a este cuestionario informando de sus puntuaciones directas y puntuaciones T (media=50, desviación típica=10). Asimismo, se aporta una interpretación de las puntuaciones en cada escala según el resultado, además de una representación gráfica. Por último, se aportan los textos de algunos ítems cuyas respuestas pueden ser objeto de especial atención.

Este test mide las siguientes escalas: Ansiedad por separación/Fobias, índice TAG, Ansiedad social, Obsesiones y compulsiones, Síntomas físicos y Evitación de daño. La escala de Ansiedad Social se divide en dos subescalas: Humillación/Rechazo y Actuación. De manera similar, la escala de Síntomas Físicos se divide en: Pánico y Tensión/inquietud. Asimismo, este informe aporta una puntuación total para el test que se acompaña de la probabilidad de padecer un trastorno de ansiedad basándose en los resultados. Además, este test incluye una escala de control de respuestas en la forma de un índice de Inconsistencia, que comprueba la coherencia interna que ha tenido la persona a la hora de contestar.

## Uso del informe

Las decisiones basadas en los resultados de la MASC2-SR (Cuestionario Autoinforme) deben ser tomadas con el apoyo de profesionales cualificados. Este, como cualquier otro informe obtenido por plataformas digitales, se considera una hipótesis que debe ser acompañada por otras fuentes de información (entrevistas, otras evaluaciones...).

Ha de tenerse en cuenta que los resultados del cuestionario son tales conforme a las respuestas que la persona ha dado sobre sí mismo, por lo que son dependientes de su franqueza y autoconciencia. Con todo, no hay resultados “correctos” o “incorrectos” de este cuestionario y los resultados deben contextualizarse en la situación de referencia de la persona.



## Resumen de resultados

### Escalas Principales de Ansiedad

	Puntuación directa	Puntuación T
1. Ansiedad por separación/Fobias	22	68
2. Índice TAG*	27	73
3. Ansiedad social	19	63
3.1. Humillación/Rechazo	11	61
3.2. Actuación	8	61
4. Obsesiones y compulsiones	24	69
5. Síntomas físicos	29	71
5.1. Pánico	16	70
5.2. Tensión/Inquietud	13	71
6. Evitación del daño	21	68

### Puntuaciones globales

Puntuación total	120	73
Probabilidad de ansiedad	3	-
Índice de inconsistencia	6	-

\*Trastorno de Ansiedad Generalizada

## Escala general

### Puntuación total



## Escalas Principales de Ansiedad

### 1. Ansiedad/Fobia por separación




### 2. Índice TAG




### 3. Ansiedad social



#### 3.1. Subescala de Humillación/Rechazo



#### 3.2. Subescala de Actuación




## 4. Obsesiones y compulsiones




## 5. Síntomas físicos



### 5.1. Subescala Pánico



### 5.2. Subescala Tensión/Inquietud



## 6. Evitación del daño



## Interpretación de los resultados

### Escala de control

El Índice de inconsistencia sirve para detectar indicios de falta de validez en el estilo de respuesta de la persona evaluada. En este caso, no se aprecia un estilo de respuesta inconsistente.

### Escala general

La Puntuación total de la MASC2 representa la severidad y prevalencia de síntomas de ansiedad en un niño o adolescente. La persona evaluada ha obtenido una Puntuación Total muy alta. Puede experimentar un número alto de signos y síntomas de ansiedad. El análisis de las escalas principales servirá para identificar qué componentes de la ansiedad son más problemáticos.

Basándose en los resultados de las principales escalas de este test, la probabilidad de la presencia de un trastorno de ansiedad es baja.

### Escalas principales de ansiedad

La puntuación en la escala de Ansiedad por separación/Fobias ha sido muy alta. Esto implica que la persona evaluada puede sentir mucha angustia al separarse de su familia o de sus seres queridos y experimentar miedo intenso de ciertos lugares o cosas (por ejemplo, la oscuridad o estar en un coche).

El Índice TAG evalúa la prevalencia de síntomas asociados al trastorno de ansiedad generalizada. Esta persona ha puntuado muy alto en este índice, lo que implica la presencia notable de síntomas como preocupación excesiva sobre eventos futuros y algunos síntomas físicos asociados.

La escala de Ansiedad social evalúa la posible experiencia por parte de la persona evaluada de síntomas relacionados con el rechazo, vergüenza anticipada y miedo a exponerse pública o interpersonalmente. La puntuación en esta escala ha sido alta. El análisis de las siguientes subescalas identificará qué clase de problemas de ansiedad social son más acentuados.

La puntuación en la primera subescala de Ansiedad social (Humillación/Rechazo) es alta, por lo que la persona puede experimentar angustia y ansiedad ante la posibilidad de ser humillada, avergonzada o rechazada por otros en un contexto social a un nivel superior a su contexto de referencia.

La otra subescala de Ansiedad social (Actuación) evalúa el miedo a actuar. La puntuación alta obtenida indica que la persona puede sentir malestar cuando tiene que presentarse en situaciones públicas (por ejemplo, hablar en público o responder a una pregunta del profesor en clase).

Pasando a la escala de Obsesiones y compulsiones, se observa una puntuación muy alta. La persona evaluada puede experimentar pensamientos obsesivos y/o perseverar en conductas compulsivas que pueden ser coherentes con un diagnóstico de Trastorno Obsesivo-Compulsivo, incluyendo pensamientos de que a otros les haya pasado algo malo (por ejemplo, que estén heridos), comprobación excesiva, miedo a la contaminación, limpieza como ritual y escrupulosidad.

La escala de Síntomas físicos evalúa la experiencia de la persona con síntomas de tensión, inquietud o pánico. La puntuación de esta escala ha sido muy alta. Aunque los síntomas físicos por sí solos no son predictivos de trastorno de ansiedad a nivel diagnóstico, son objeto de intervención frecuentemente. El análisis de las siguientes subescalas identificará qué clase de síntomas físicos son más problemáticos.

En la subescala de Pánico, la puntuación es muy alta. La persona puede experimentar los siguientes síntomas de pánico: dolores en el pecho, manos sudorosas o frías, sentirse mal del estómago, quedarse sin aliento, mareos, respiración irregular, sentirse extraño, raro o irreal. Si estos síntomas de pánico no son provocados, debería tenerse en consideración un posible diagnóstico de trastorno por pánico.



La otra subescala de Síntomas físicos (Tensión/Inquietud) evalúa la tensión o inquietud que siente la persona. La puntuación obtenida es muy alta, por lo que la persona puede sentirse de forma muy frecuente tensa, agitada, inquieta, exhausta o al límite.

Por último, en la escala de Evitación de daño, la persona ha obtenido una puntuación muy alta. Esto indica que puede tener conductas que eviten el daño o consecuencia negativas, asuntos ilegales y/o peligros. Aunque las conductas de evitación del daño por sí solas no predicen trastornos de ansiedad a un nivel diagnóstico, frecuentemente son objeto de tratamientos por exposición.

## Ítems con respuestas muy elevadas

A continuación, presentamos algunos ítems cuya respuesta dada es merecedora de especial atención en el análisis de la ansiedad en la persona evaluada. Se considera que los siguientes ítems se han marcado con una respuesta muy elevada para su norma de referencia.

1. Me siento tenso/a o nervioso/a
15. Soy asustadizo/a
17. Dejo la luz encendida por la noche
18. Tengo dolor en el pecho
19. Evito ir a sitios sin mi familia
24. Siento que mi corazón se acelera y tengo palpitaciones
27. Me siento inquieto/a e intranquilo/a
30. Me asusto cuando voy en coche o autobús
31. Me siento asqueado/a
33. El mal tiempo, la oscuridad, las alturas, las animales o los bichos me dan miedo
37. Siento mis manos frías o sudorosas
41. Tengo pensamientos malos estúpidos que no puedo parar
43. Me molesta mucho la suciedad, los gérmenes, los químicos, la radiación o las cosas pegajosas
45. Temo que seré el/la responsable de que algo malo suceda
47. Tengo que comprobar las cosas varias veces
49. Me preocupa demasiado el pecado o las malas acciones



#	R	#	R	#	R	#	R	#	R	#	R	#	R	#	R	#	R		
001	3	002	2	003	2	004	2	005	2	006	2	007	2	008	2	009	2	010	2
011	3	012	2	013	3	014	2	015	3	016	2	017	3	018	2	019	3	020	2
021	3	022	2	023	3	024	2	025	3	026	2	027	3	028	2	029	3	030	2
031	3	032	2	033	3	034	2	035	3	036	2	037	3	038	2	039	3	040	2
041	3	042	2	043	3	044	2	045	3	046	2	047	3	048	2	049	3	050	1

